

がん化学療法レジメン

| 疾患名 | 療法名 | 催吐性 | 制吐剤 | 投与量 | 投与日 | 薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与期間・クール | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---|--------------------------------|---|----------------------|--|--------|---|---|---|----------------------|
| 大腸癌 | C-mab 初回/2回目以降 | Mini | DEX注 | 9.9mg | day1 | C-mab | 400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降) | day1 | 1週間 | | | |
| | | | ボラミン注 | 5mg | day1 | | | | | | | |
| | C-mab+CPT-11 初回/2回目以降 | M | パロノセトロン | 0.75mg | day1 | C-mab | 400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降) | day1,8 | 2週間 | | | |
| | | | DEX注 DEX錠 | 9.9mg 8mg | day1.8 day2-3 | | | | | CPT-11 | 180mg/m ² | day1 |
| | | | ボラミン注 | 5mg | day1 | | | | | | | |
| | C-mab+I-LV/5-FU 初回/2回目以降 入院/SV2.5使用 | L | DEX注 | 6.6mg | day1.8 | C-mab | 400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降) | day1.8 | 2週間 | | | |
| | | | ボラミン注 | 5mg | | | | | | I-LV | 200mg/m ² | day1 |
| | | | | | | | | | | 5-FU | ボース 400mg/m ² 持注 2,400mg/m ² (入院は1,200mg/m ² ×2回) | day1 day1-2(46hr) |
| | C-mab+FOLFIRI 初回/2回目以降 入院/SV2.5使用 | M | パロノセトロン | 0.75mg | day1 | C-mab | 400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降) | day1.8 | 2週間 | | | |
| | | | DEX注 DEX錠 | 9.9mg 8mg | day1.8 day2-3 | | | | | I-LV | 200mg/m ² | day1 |
| | | | ボラミン注 | 5mg | day1.8 | | | | | | | |
| | | | | | 5-FU | | | | | ボース 400mg/m ² 持注 2,400mg/m ² (入院は1,200mg/m ² ×2回) | day1 day1-2(46hr) | |
| | C-mab+mFOLFOX6 初回/2回目以降 入院/SV2.5使用 | M | パロノセトロン | 0.75mg | day1 | C-mab | 400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降) | day1.8 | 2週間 | | | |
| | | | DEX注 DEX錠 | 9.9mg 6.6mg 8mg | day1 day8 day2-3 | | | | | I-LV | 200mg/m ² | day1 |
| | | | ボラミン注 | 5mg | day1 | | | | | | | |
| | | | | | 5-FU | | | | | ボース 400mg/m ² 持注 2,400mg/m ² (入院は1,200mg/m ² ×2回) | day1 day1-2(46hr) | |
| | I-LV/5-FU 入院/SV2.5使用 | L | | | | I-LV | 200mg/m ² | day1 | 2週間 | | | |
| | | | | | | | | | | 5-FU | ボース 400mg/m ² 持注 2,400mg/m ² (入院は1,200mg/m ² ×2回) | day1 day1-2(46hr) |
| | FOLFIRI 入院/SV2.5使用 | M | パロノセトロン | 0.75mg | day1 | I-LV | 200mg/m ² | day1 | 2週間 | | | |
| | | | DEX注 DEX錠 | 9.9mg 8mg | day1 day2-3 | | | | | CPT-11 | 150mg/m ² | |
| | | | | 5-FU | ボース 400mg/m ² 持注 2,400mg/m ² (入院は1,200mg/m ² ×2回) | | | | | | | day1 day1-2(46hr) |
| FOLFOXIRI 入院/SV2.5使用 | H | アプレピタント | 125-80-80mg | day1-3 | CPT-11 | 165mg/m ² | day1 | 2週間 | | | | |
| | | パロノセトロン | 0.75mg | day1 | | | | | I-LV | 200mg/m ² | | |
| | | DEX注 DEX錠 | 9.9mg 8mg | day1 day2-4 | | | | | | | L-OHP | 85mg/m ² |
| | | | | 5-FU | | | | | ボース 400mg/m ² 持注 3,200mg/m ² (入院は1,600mg/m ² ×2回) | day1 day1-2(48hr) | | |
| IRIS | M | パロノセトロン | 0.75mg | day1,15 | CPT-11 | 125mg/m ² | day1,15 | 4週間 | | | | |
| | | DEX注 DEX錠 | 9.9mg 8mg | day1,15 day2-3, day16-17 | | | | | S1 | 80mg/m ² /日 ※規格 25mg/20mg | day1-14 | |
| IRIS+B-mab q4w | M | パロノセトロン | 0.75mg | day1,15 | BV | 5mg/kg | day1,15 | 4週間 | | | | |
| | | DEX注 DEX錠 | 9.9mg 8mg | day1,15 day2-3, day16-17 | | | | | CPT-11 | 100mg/m ² | | |
| | | | | S1 | | | | | | | 80mg/m ² /日 ※規格 25mg/20mg | day1-14 |
| P-mab | Mini | | | | P-mab | 6mg/kg | day1 | 2週間 | | | | |
| P-mab+CPT-11 | M | パロノセトロン | 0.75mg | day1 | P-mab | 6mg/kg | day1 | 2週間 | | | | |
| | | DEX注 DEX錠 | 9.9mg 8mg | day1 day2-3 | | | | | CPT-11 | 125mg/m ² | | |
| P-mab+I-LV/5-FU 入院/SV2.5使用 | L | | | | P-mab | 6mg/kg | day1 | 2週間 | | | | |
| | | | | | | | | | I-LV | 200mg/m ² | day1 | |
| | | | | | | | | | 5-FU | ボース 400mg/m ² 持注 2,400mg/m ² (入院は1,200mg/m ² ×2回) | day1 day1-2(46hr) | |
| P-mab+FOLFIRI 入院/SV2.5使用 | M | パロノセトロン | 0.75mg | day1 | P-mab | 6mg/kg | day1 | 2週間 | | | | |
| | | DEX注 DEX錠 | 9.9mg 8mg | day1 day2-3 | | | | | I-LV | 200mg/m ² | | |
| | | | | CPT-11 | | | | | | | 150mg/m ² | |
| | | 5-FU | ボース 400mg/m ² 持注 2,400mg/m ² (入院は1,200mg/m ² ×2回) | day1 day1-2(46hr) | | | | | | | | |
| P-mab+mFOLFOX6 入院/SV2.5使用 | M | パロノセトロン | 0.75mg | day1 | P-mab | 6mg/kg | day1 | 2週間 | | | | |
| | | DEX注 DEX錠 | 9.9mg 8mg | day1 day2-3 | | | | | I-LV | 200mg/m ² | | |
| | | | | L-OHP | | | | | | | 85mg/m ² | |
| | | | | 5-FU | | | | | ボース 400mg/m ² 持注 2,400mg/m ² (入院は1,200mg/m ² ×2回) | day1 day1-2(46hr) | | |