

がん化学療法レジメン

悪性軟部腫瘍

疾患名	療法名	制吐剤など	投与量	投与日	薬剤名	投与量	投与日	投与期間・1クール
悪性軟部腫瘍	ドキソルビシン	パロノセトロン	0.75mg	day1	DXR	75mg/m ²	day1	3週間
		DEX注	9.9mg	day1				
		アプレピタント	125-80-80mg	day1-3				
		DEX錠	8mg	day2-4				
	トラベクテジン	パロノセトロン	0.75mg	day1	トラベクテジン	1.2mg/m ²	day1	3週間
		DEX注	16.5mg	day1				
		DEX注(省略可)	6.6mg	day2				
		DEX錠(省略可)	4mg	day3				
	AI	グラニセトロン	3mg	day1-4	DXR	25mg/m ²	day1-3	3週間 計6クール
		DEX注	9.9mg	day1-4	メスナ	500mg/m ² ※3回/日	day1-4	
		アプレピタント	125-80-80mg	day1-3	IFM	2.5g/m ²	day1-4	
		peg-G-CSF	3.6mg	day5				
	GEM+DOC	グラニセトロン	3mg	day1.8	GEM	675mg/m ²	day1.8	3週間
		DEX注	6.6mg	day8	DOC	60mg/m ²	day8	
	エリブリン	DEX注	6.6mg	day1.8	ERI	1.4mg/m ²	day1.8	3週間